

Enfermedades Prostáticas

ACERCA DEL DIAGNÓSTICO

Como en los seres humanos varones, los perros y gatos machos tienen próstatas. La glándula prostática está ubicada en el abdomen (barriga), y circunda el cuello de la vejiga urinaria y parte de la uretra (el tubo que transporta la orina desde la vejiga urinaria y a través del pene). La próstata segrega un fluido que realza la motilidad y fertilidad del esperma y es por lo tanto importante en la reproducción. Las enfermedades prostáticas son comunes en perros machos, especialmente al envejecer, pero son poco comunes en gatos machos.

Causa: Existen muchos tipos de enfermedades prostáticas, cada cual con su propia causa o causas. Todos estos trastornos llevan a un engrosamiento de la glándula prostática (prostatomegalia), lo cual puede ser algunas veces doloroso y / o puede interferir con la evacuación normal de las heces (deposición) u orina.

- La **prostatitis** es una inflamación de la glándula prostática, por lo general debido a una infección bacteriana. La prostatitis tiene un amplio espectro de severidad, desde un malestar leve hasta severo o incluso que atente contra la vida si causa septicemia (infección sanguínea / envenenamiento sanguíneo). Hay una mayor probabilidad de que la prostatitis ocurra en perros que no han sido castrados.
- Los **abscesos prostáticos** son acumulaciones de pus en la glándula que resultan de la prostatitis. Pueden volverse bastante grandes y atentar contra la vida. Por lo tanto, uno de los objetivos del tratamiento de prostatitis es el de reducir el riesgo de abscesos prostáticos.
- Los **quistes paraprostáticos** son sacos benignos, llenos de fluido conectados a la glándula prostática a través de un fino tallo. Estos quistes pueden volverse bastante grandes, pero son en general inofensivos, a menos que su mero tamaño interfiera los órganos de alrededor. Por lo general, su causa no es clara.
- La **neoplasia prostática** (cáncer) puede ocurrir en perros y es más común en perros mayores. Este cáncer se propaga a otras zonas (metastatiza) o puede haberse originado en otro sitio como la vejiga urinaria (cáncer secundario).
- La **hiperplasia prostática benigna** es causada por hormonas masculinas y es común en perros de edad mediana a edades mayores. Es en general una enfermedad inofensiva en sí misma, aunque puede favorecer que se presenten otras enfermedades de la próstata. La hiperplasia prostática benigna ocurre con mayor frecuencia en perros no castrados que en perros castrados. Es la causa más común de un engrosamiento prostático ("prostatomegalia") en perros.
- La **metaplasia escamosa** es en general un engrosamiento inofensivo de la próstata causado por un exceso de estrógeno. Altos niveles de estrógeno en perros machos son en general el resultado de tumores testiculares benignos.

Diagnóstico: El veterinario querrá saber acerca de la naturaleza y ocurrencia de los síntomas, y le pedirá a usted un historial completo que incluya los síntomas observados, duración de los síntomas y todos los medicamentos actuales y demás. El veterinario también realizará un minucioso examen físico, que incluirá un palpado rectal, para intentar determinar si la glándula rectal es anormal. Muchas veces, es necesario realizar exámenes de diagnóstico adicionales para distinguir la causa de una próstata anormal. Estos

exámenes pueden incluir radiografías abdominales, ecografías, punciones de fluidos con aguja fina, cultivo de orina u otro fluido aspirado, masaje prostático para recolectar material de la glándula y biopsia de la próstata. Se podrían llevar a cabo exámenes de sangre (hemograma completo, perfil de suero bioquímico y perfil de coagulación), así como un análisis de orina junto con el cultivo de orina para evaluar la salud general y para determinar si su perro es candidato para la sedación o anestesia, las cuales son requeridas para la punción con aguja fina y la biopsia. Sin embargo, a diferencia de la medicina humana, no existe un único examen de sangre para la próstata en perros, razón por la cual es necesaria una combinación de otros exámenes. No todos los exámenes son apropiados para todos los perros. Su veterinario puede hablarle sobre estos exámenes.

CÓMO CONVIVIR CON EL DIAGNÓSTICO

Los cuidados en la casa dependen del tipo específico de la enfermedad de próstata que ha sido diagnosticado. Administre el medicamento exactamente como le fue indicado. Si su perro tiene hiperplasia prostática benigna asintomática, es importante saber que los síntomas pueden desarrollarse en cualquier momento. La prostatitis y los abscesos pueden recurrir, y la recurrencia de los síntomas originales es, en general, la indicación más importante de que es necesaria una visita a un veterinario sin demora. En general, los síntomas más importantes a tener en cuenta tienen que ver con las funciones corporales. No debería haber excesiva dificultad al evacuar orina o heces. Estos tipos de dificultades, si ocurren, pueden deberse a una enfermedad existente de la próstata y pueden ocasionar bloqueos urinarios o intestinales. Por lo tanto, si un perro con enfermedad prostática muestra estos síntomas, o si se siente peor de cualquier otro modo (por ejemplo, disminución del apetito o nivel de energía, vómitos, respiración laboriosa) entonces una revisión inmediata es necesaria.

Con frecuencia, la castración es realizada si la próstata está ocasionando problemas debido a su engrosamiento; esto permite que la próstata se encoja durante un período de varias semanas. Si su perro ha sido castrado recientemente, preste especial atención a la incisión y contacte a su veterinario si usted nota hinchazón, rezumado o enrojecimiento. Siga al pie de la letra todas las instrucciones de cuidado en casa.

TRATAMIENTO

El tratamiento depende de la causa. La hiperplasia prostática benigna y la metaplasia escamosa pueden ser tratadas mediante castración para extraer la fuente de hormonas que ocasionan estos problemas. La prostatitis se trata con antibióticos y puede requerir hospitalización y el suministro de fluidos intravenosos puede ser requerido. Cuando el perro esté estable, puede que le recomienden castrarlo. Los quistes paraprostáticos son tratados con extracción quirúrgica o drenaje periódico con aguja (solución temporaria); la castración puede ser recomendada. El cáncer prostático es en general bastante serio y desafortunadamente acorta la esperanza de vida de los perros que lo tienen. Si bien la excisión quirúrgica de la glándula (prostatectomía), la quimioterapia, la terapia de radiación y la terapia hormonal son opciones, su nivel de eficacia ha sido limitado. Debido a la seriedad del cáncer prostático, es esencial que el diagnóstico sea definitivo. Es decir que, el cáncer debe ser diagnosticado de manera definitiva por el laboratorio en una biopsia de un espécimen prostático.

Medicamentos para controlar el dolor (analgésicos) pueden darse para todos los tipos de enfermedades prostáticas sintomáticas que ocasionen malestar.

Qué hacer

- Informe a su veterinario si su perro ha sido diagnosticado con alguna enfermedad médica alguna vez y está tomando medicamentos.
- Administre los medicamentos exactamente como le fue indicado por su veterinario, y si está preocupado acerca de los posibles efectos negativos, hágale con su veterinario inmediatamente en lugar de discontinuar el tratamiento.

Qué no hacer

- No postergue visitar a su veterinario si observa algún síntoma de enfermedad prostática en su perro (véase “Esté atento a los siguientes indicios”). Ciertos tipos de enfermedad prostática como la prostatitis aguda y los abscesos prostáticos pueden poner en peligro de vida al animal y requerir de tratamiento inmediato.
- No dé medicamentos que usted tenga en casa y que hayan sido recetados para humanos; algunos de estos pueden interferir con el tratamiento e incluso ocasionar problemas mucho más severos.

CUÁNDO LLAMAR A SU VETERINARIO

- Si usted no puede asistir a una cita fijada.
- Si usted no puede dar el medicamento como le fue indicado.
- Si su perro no mejora después de iniciado el tratamiento.

ESTÉ ATENTO A LOS SIGUIENTES INDICIOS

- Indicios generales de enfermedad: letargo, debilitamiento, vómitos, disminución del apetito, variación de peso y otros cambios en el comportamiento.

- Indicios de enfermedad prostática: sangre en la orina (hematuria), secreción de sangre del pene en cualquier momento, esfuerzo al defecar (tenesmo) o al orinar (estranguria), infecciones del tracto urinario recurrentes, infertilidad, dolor de abdomen, andar anormal con las patas traseras.

SEGUIMIENTO RUTINARIO

- Las citas de seguimiento son típicamente fijadas para monitorear el progreso, ajustar el plan de tratamiento si fuese necesario, buscar anomalías en los exámenes de sangre anteriores y hablar sobre la castración o realizarla.



900 Pine Ave
Long Beach, CA 90813

Text/Call: (562) 912-7463

Email: info@PineAnimalHospital.com

Website: www.PineAnimalHospital.com

También disponible en inglés.